

Segreteria Regionale Puglia

Comunicato stampa

Conferenza stampa sulla vaccinazione antinfluenzale.

Bari 3 novembre – ore 12,00

Sede Regionale Fimmg Puglia

Via SS. Cirillo e Metodio 5/B – Bari

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia influenzale e le sue complicanze.

Il vaccino antinfluenzale ha un'efficacia, in termini di riduzione di morbosità, in soggetti sani adulti, variabile dal 70 al 90%; negli ultra sessantacinquenni riduce la mortalità legata all'influenza del 70-80% in quanto riduce in modo sostanziale la frequenza delle sue complicazioni.

Sulla base dei riscontri epidemiologici e sierologici riguardanti la circolazione di virus influenzali nella passata stagione, ottenuti grazie alla rete per la sorveglianza ed il controllo dell'influenza, che si estende in 82 paesi del mondo, Italia compresa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che il vaccino antinfluenzale da utilizzare per la prossima campagna 2011 - 2012 nell'emisfero settentrionale, sia un vaccino trivalente contenente i seguenti antigeni:

- antigene analogo al ceppo **A/California/7/2009 (H1N1)-like virus;**
- antigene analogo al ceppo **A/Perth/16/2009(H3N2)- like virus;**
- antigene analogo al ceppo **B/Brisbane/60/2008 – like virus.**

Il periodo ottimale per l'avvio delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è, per la nostra situazione climatica e per l'andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, quello autunnale, nel mese di **novembre**.

Se un anticipo della somministrazione del vaccino antinfluenzale è sconsigliabile, è possibile, invece, effettuare la vaccinazione anche dopo tale data, secondo le indicazioni del proprio medico curante.

Poiché la maggior parte della popolazione è venuta in contatto con i virus influenzali presenti nel vaccino nel corso degli ultimi anni, **una sola dose di vaccino antinfluenzale è sufficiente** per i soggetti di tutte le età, con esclusione dell'età infantile.

Per i bambini al di sotto dei 12 anni di età, mai vaccinati in precedenza, si raccomandano **due dosi** appropriate per l'età di vaccino antinfluenzale, da somministrare a distanza di almeno quattro settimane per assicurare una soddisfacente risposta immunitaria.

L'epidemia dell'influenza è prevista dagli esperti nel periodo dopo Natale. In genere in Puglia presenta il suo picco più elevato tra la 8^a e la 10^a settimana dell'anno, ossia a fine febbraio.

Il vaccino antinfluenzale può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini, sia pediatrici che per l'età adulta, utilizzando sedi corporee e siringhe diverse.

Alla conferenza stampa interverranno: il **dott. Giovanni Sportelli** – Segretario Provinciale FIMMG Bari, il **dott. Filippo Anelli** – Segretario Regionale FIMMG Puglia e il **dott. Domenico Lagravinese** – Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari.

Bari, 2 novembre 2011