



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE
UFFICIO 1

Prot. n° 24/2033 /1.

Bari, li 30 NOV. 2005

Si trasmette solo via fax, ai sensi
dell'Art. 38 - DPR 445/2000

- Ai Sigg.ri Direttori Generali
delle AA.SS.LL.
LORO SEDI
- Ai Sigg.ri Responsabili dei
Dipartimenti di Prevenzione
AA.SS.LL.
LORO SEDI
- All' Ordine dei Medici di
BA-BR-FG-LE-TA
LORO SEDI
- Alla Segreteria regionale FIMMG
Via Santi Cirillo e Metodio, 5/b
BARI
- Alla Segreteria regionale FIMP
Via Sant' Antonio, 73/H
BARLETTA
- Alla Segreteria regionale CIPE
Via C. Betocchi
GRAVINA (BA)
- Alla Segreteria regionale CUMI/AISS F.M.
Via Magna Grecia, Pal H/1
BARI
- Alla Segreteria regionale INTESA SIND.
Via Valle, 1 - Palese
BARI
- Alla Segreteria regionale CGIL
Via V. Calace, 4
BARI
- Alla Segreteria regionale SNAMI
Via Monte San Michele, 10
LECCE
- Al Ministero della Salute - ROMA -
All' Osservatorio Epidemiologico
Regionale
BARI

e.p.c.

Oggetto: Vaccinazione Antinfluenzale -
Modalità di offerta.

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza delle SS.LL., si trasmette in allegato la nota ministeriale prot. DGPREV./27497/P/1.4.c.a.9 del 25 novembre 2005, relativa a

segnalazioni che giungono al predetto dicastero circa la programmazione di appuntamenti presso ASL e Medici di Medicina Generale, per la somministrazione di dosi di richiamo per la vaccinazione antinfluenzale (corrente stagione 2005-2006) ovvero della somministrazione di due dosi di vaccino nella stessa seduta "giustificate" da un "carente stato di salute del soggetto".

Al riguardo, il Ministero nell'evidenziare che la somministrazione di eventuali dosi di richiamo di vaccini dovrebbe essere effettuata in base a specifiche schedule e mai nella stessa seduta, ribadisce che la protezione anticorpale è garantita da una sola dose di vaccino antinfluenzale come previsto nella circolare "Prevenzione e controllo dell'Influenza: raccomandazioni per la stagione 2005-2006".

Per i bambini al di sotto dei 9 anni, mai vaccinati in precedenza, si raccomandano due dosi appropriate per l'età di vaccino antinfluenzale da somministrare a distanza di almeno quattro settimane al fine di assicurare una soddisfacente risposta immunitaria.

Il Ministero richiama inoltre l'opportunità della corretta conduzione della campagna di vaccinazione al fine di non creare carenza nell'offerta della stessa per le categorie cui è prioritariamente prevista (c.f.r.: nota assessorile n. 24/24562/3 del 28.9.2005 già in possesso delle SS.LL.).

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler dare ampia diffusione della presente a tutti i servizi e strutture interessate del territorio.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

IL DIRIGENTE DI UFFICIO
(Dr. Enrico Manno)



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio V

Malattie Infettive e Profilassi Internazionale

N. DGPREV/27497/P/1.4.c.a.9

Risposta al Foglio del.

OGGETTO: Vaccinazione Antinfluenzale -
Modalità di offerta

Roma 25 novembre 2005

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni a
Statuto Ordinario e a Statuto Speciale
LORO SEDI

Agli Assessorati alla Sanità delle Province
Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

e p.c.

Direzione Generale della Programmazione
Sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza
e dei principi etici di sistema - Ministero
della Salute

SEDE

Istituto Superiore di Sanità
ROMA

Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici e degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo n°80/A
ROMA

Alla Federazione Nazionale degli Ordine
dei Farmacisti
Via Palestro n°75
ROMA

Nelle ultime settimane stanno giungendo, a questa Direzione Generale, segnalazioni che riferiscono circa la programmazione di appuntamenti, presso ASL/Medici di Medicina Generale, per la somministrazione di dosi di richiamo per la vaccinazione antinfluenzale (corrente stagione 2005-2006), ovvero della somministrazione di due dosi di vaccino nella stessa seduta, "giustificate" da un "carente stato di salute del soggetto".

Fermo restando che la somministrazione di eventuali dosi di richiamo dei vaccini dovrebbe essere effettuata in base a specifiche schedule e mai nella stessa seduta vaccinale, si ribadisce che un'adeguata e protettiva copertura anticorpale è garantita dalla somministrazione di una singola dose di vaccino

antinfluenzale, come peraltro previsto nella Circolare Ministeriale n°1 del 5 agosto 2005, "Prevenzione e Controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2005-2006":

"...Poiché la maggior parte della popolazione è stata, con tutta probabilità, infettata dai virus influenzali A/H3N2, A/H1N1 e B nel corso degli ultimi anni, una sola dose di vaccino antinfluenzale è sufficiente per i soggetti di tutte le età, con esclusione dell'età infantile. Per i bambini al di sotto dei 9 anni di età, mai vaccinati in precedenza, si raccomandano due dosi appropriate per l'età di vaccino antinfluenzale, da somministrare a distanza di almeno quattro settimane per assicurare una soddisfacente risposta immunitaria; la seconda dose di vaccino dovrebbe preferibilmente essere somministrata entro la fine di novembre, primi giorni di dicembre...".

Si richiama l'attenzione inoltre, sull'importanza del rispetto di tali indicazioni anche alla luce della aumentata adesione alla campagna di vaccinazione corrente che, qualora non fosse condotta in modo appropriato, potrebbe creare una carenza nell'offerta della stessa per le categorie cui è prioritariamente indirizzata.

Si prega di voler dare massima diffusione della presente ai servizi e soggetti interessati.

OC

F.to Il Direttore dell'Ufficio V
Dott.ssa Maria Grazia Pompa

F.to Il Direttore Generale
Dott. Donato Greco